

眼内コンタクトレンズ(ICL)治療は
メガネやコンタクトレンズの
煩わしさから開放してくれます



ICL治療ではじまる
新しい生活を見つけて下さい



ICL手術

角膜を削らない
眼内コンタクトレンズ視力矯正



ICLとは生体に適合しやすい
素材を使って作られた
**レンズを眼球の中に入れて
近視や乱視を治す**手術方法です。

眼球内の虹彩と水晶体の間に
レンズを入れるので、
**肉眼では見えませんし、
特別なメンテナンスも
必要ありません。**

ICL手術

角膜を削らない
眼内コンタクトレンズ視力矯正



メガネやコンタクトレンズを使用する方が、**裸眼で遠くが見えるようになる**手術です。

一般的に知られているレーシックは角膜を削りますが、ICLでは必要があればレンズを取り出すことができるので、**眼球の形を変えずに治療**でき、見え方の質も良好です。

ICL手術

ICLのメリット

- ◆ 万一の場合でもレンズを取り出し、**元の状態に戻す**ことができます。
- ◆ 終日を**裸眼で生活**できるので、災害時にも安心です。
- ◆ 近視が強い方でも**矯正可能**です。
- ◆ シャープで**あざやかな見え方**が期待できます。



ICL手術

ICLのメリット

- ◆ レーシックはドライアイになりやすいですが、ICLでは**ドライアイ**にはなりません。
- ◆ **紫外線**をカットします。
- ◆ コンタクトレンズと違い、**維持費**がかかりません。
- ◆ **医療費控除の対象**になります。



ICL手術

ICLのデメリット

自費診療となるため経済的負担が大きくなります。

当院では	両眼・乱視なし	64万円 (税込)
	両眼・乱視あり	68万円 (税込)

(術前検査、手術、薬、術後3ヶ月間の検査費用込)

ICL手術

ICLの手術について 術前検査

レンズの適応基準を満たしているかを確認するため、**術前検査**を行い、総合的に適応についてカウンセリングを行います。術前検査では瞳孔を広げて、眼底検査を行いますので、当日から**2日間**くらいはまぶしくなったり、**物が見えにくく**なりますので、**車で来院**はされないでください。



ICL手術

ICLの手術について 術前検査

また、正確な度数を測定するため、コンタクトレンズを装着している方は**一定期間装用の中止**が必要になります

ソフトコンタクトレンズ：3日間
ハードコンタクトレンズ：2週間

ご不便をおかけいたしますが、
ご理解ください。
術前検査後からコンタクトレンズ装用は
できるようになります。



ICL手術

ICLの手術について 手術当日

- リラックスできる服装でご来院下さい。
- お化粧品はお控え下さい。
- 公共交通機関やタクシーでご来院下さい。
手術後は許可があるまで車の運転はできません。

ICL手術

ICLの手術について 手術当日




目薬で瞳孔を広げて、点眼麻酔をして、
角膜の縁を約3mmと約1mm切開します。



切開した部分からレンズを
眼の中に入れます。

ICL手術

ICLの手術について 手術当日




レンズを虹彩と水晶体の間に固定します。



瞳孔を収縮させ手術は終了です。

ICL手術

ICLの手術について 手術当日



院内でしばらくお休み頂いた後、目の状態を検査し、問題がなければお帰り頂きます。傷口が小さいので回復が早いいため、**日帰りの手術**が可能です。

ICL手術

手術後の見え方について

- **視力の変動**

術後1週間ほどは、炎症などで視力が変動することがありますが、回復とともに改善します。

完全に回復するまでは、**目を直接触らないように**注意しましょう。また制限事項も守るようにしてください。

- **ハロー・グレア**

術後しばらく見え方が変動し、夜間や暗いなかで光を見た時に、眩しさを感じるなど、**光に過敏になる**ことがあります。

通常は徐々に気にならなくなりますがこの症状が残る場合はご相談ください。

ICL手術

手術後の一般的な症状・注意事項

異物感・充血・かすみは一般的な症状です。

傷口が治癒し、炎症が治まることで、時間とともに自然に改善します。

手術後一定の期間、日常生活に制限があります。

詳しくは医師の指示に従ってください。

洗髪、洗顔/シャワー、入浴/化粧、アイメイク
飲酒、たばこ/運転/運動/プール

また、医師の指示に従ってお薬(点眼薬・内服薬)を使用し、
定期検査を受けてください。